



ПОДГОТОВКА К ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ без седации

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ и СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
– это влияет на точность и безопасность исследования!!!

!!! ОСОБЫЕ СЛУЧАИ – обратите внимание

- Если у Вас заболевание крови или принимаете лекарства, разжижающие кровь, тогда необходимы результаты общего анализа крови (ОАК) и коагулограммы – срок годности 14 дней;
- Получите заранее консультацию кардиолога клиники SBSmed если:
 1. У Вас болезнь сердца или легких, испытываете одышку, часто повышается артериальное давление, отеки на нижних конечностях или другая тяжелая болезнь;
 2. Выявили патологию по результатам ЭКГ или УЗИ сердца.

Заблаговременная консультация кардиолога
позволит избежать напрасной подготовки кишки и приема слабительного препарата!!!

1. ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ТВЕРДОЙ ПИЩИ ЗА 10 ч. ДО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Рекомендуем принимать накануне не жирную, легкоусвояемую пищу.

!!! ОСОБЫЕ СЛУЧАИ – обратите внимание

Накануне исследования ограничьтесь приемом только жидкого бульона (без твердых частиц мяса, овощей, фруктов и в т.п.) в следующих случаях:

- Придерживаетесь постельного режима и по состоянию здоровья активное движение ограничено;
- Принимаете МУНДЖАРО или другой препарат для снижения веса;
- Принимаете психотропные/седативные препараты.

!!! Известите об этом врача эндоскописта до начала исследования - эти состояния замедляют опорожнение желудка

2. ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ НЕПРОЗРАЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ за 4 ч. ДО ИССЛЕДОВАНИЯ.

Например, кофе, смузи, йогурты, апельсиновый сок, кефир и в т.п.

- ✓ Накануне исследования исключить прием спиртных напитков и, желательно, газированных напитков;
- ✓ Разрешается прием чистой воды небольшими глотками даже буквально перед началом исследования, если гастроскопия без седации/без наркоза.

!!! ЕСЛИ У ВАС АЛЛЕРГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ или НА ПИЩУ
– обязательно сообщите врачу эндоскописту



Часть 2: ПОДГОТОВКА К ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИИ без седации

ПРОСИМ ВАС ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ и СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ
– это влияет на точность и безопасность исследования!!!

3. ПРЕКРАТИТЕ ПРИЕМ ЛЕКАРСТВ ЗА 4 ч. ДО ИССЛЕДОВАНИЯ.

!!! ОСОБЫЕ СЛУЧАИ – обратите внимание

- **НЕ отменяйте прием ингаляционных препаратов** для лечения бронхиальной астмы или хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) – прием ингаляторов улучшит переносимость исследования. Если используете карманные ингаляторы, обязательно возьмите с собой.
- **Разрешается утренний прием гипотензивных лекарств для снижения артериального давления за 2 ч. до исследования.** Например, если прием таблеток по назначению определен на 7 ч. утра, тогда исследование запланируйте не ранее 9 ч. утра того же дня.
- **Необходимо заранее прекратить прием крови разжижающих препаратов**, если исследование предполагает выполнение биопсии или другого дополнительного вмешательства:
 1. **ВАРФАРИН** или другой аналогичный препарат - **за 5 дней**;
 2. **БРИЛИНТА** или другой аналогичный препарат – **за 5 дней**;
 3. **КСАРЕЛТО** или другой аналогичный препарат – **за 2 дня**;
 4. **АСПИРИН** (кардиомагнил, тромбо асс и в т.п.) – **можно НЕ отменять.**

Отмену препарата необходимо согласовать с лечащим врачом!!!
Известите об этом врача эндоскописта заранее до начала исследования!!!

4. ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

1. Список принимаемых лекарств и результаты медицинских исследований за последние 30 дней;
2. Результаты, фото и видео предыдущих эндоскопических исследований и биопсии.